



Dierenartsen
Amstel, Vecht en Venen

Nieuwsbrief Rund

Blauwtong

7 SEPTEMBER 2023

Blauwtong

Verschuinselen

Regio


Voorkomen van
besmetting
en ver-
spreiding

Er is Blauwtong vastgesteld bij schapen in de gemeenten Stichtse Vecht en Wijdmeren. En er zijn verdachte gevallen bekend bij koeien en in een naastgelegen gemeente. Deze nieuwsbrief geeft informatie om uw eigen vee te beschermen tegen besmetting en om verdere verspreiding van het blauwtongvirus te voorkomen.




De verschuinselen van blauwtong bij schapen

Dieren hebben koorts, zijn ziek, sloom, kreupel, lopen stijf en eten slecht. Als je nauwkeurig kijkt zie je meestal kleine ontstekingen aan de neusspiegel, oogleden, tandvlees, tussenklauwspleet en kroonrand. Bij aanraken van het tandvlees en de mondhoecken ontstaan snel kleine bloedinkjes. Plotselinge sterfte is ook een verschuinsel van blauwtong bij schapen.



De verschuinselen van blauwtong bij koeien

Verschuinselen bij koeien lijken op die bij schapen, maar over het algemeen zijn koeien minder ernstig ziek en is de ziekte minder opvallend. Koeien tonen een klein beetje verhoging variërend van 39,0 tot 40,0; besmette koeien vreten iets minder en lopen stijf. Als je nauwkeurig kijkt kan je ontstekingen zien aan de neusspiegel en oogleden met een gezwollen bovenlip en neus. Verder kunnen de kroonranden en kogels verdikt zijn door onderhuids vocht. Soms zijn de spenen van het uier ruw en rood.



De verschuinselen van blauwtong bij geiten

lijken op die bij schapen en koeien en de ernst van de verschuinselen kan variëren van heel mild tot erg ziekmakend.



Dierenartsen
Amstel, Vecht en Venen

Nieuwsbrief Rund

Blauwtong

7 SEPTEMBER 2023

Blauwtong

Verschuinselen

Regio

Voorkomen van besmetting en verspreiding

Als u deze verschuinselen ziet bij uw vee: bel het meldpunt dierziekten op telefoonnummer **045-5463188**.

Als u twijfelt: bel de praktijk of uw veearts voor overleg.

Uw melding wordt gebruikt door het crisis-team van de NVWA om de verspreiding van het blauwtongvirus te monitoren en om passende maatregelen te kunnen nemen om verspreiding zoveel mogelijk tegen te gaan. Na melding bestaat de kans dat een NVWA-dierenarts het zieke dier wil zien en een bloedmonster laat onderzoeken op blauwtong afweerstoffen en blauwtong-virus. Dat zal niet bij elke melding gebeuren. Als een NVWA dierenarts uw bedrijf bezoekt, zal hij alleen aandacht geven aan uw zieke dieren en geen andere zaken onder de loep nemen.

In een eventueel **bloedmonster** wordt getest op blauwtong-virus en op blauwtong afweerstoffen. Blauwtong afweerstoffen verschijnen pas in het bloed wanneer het dier enkele weken besmet is geweest. Als u tijdig meldt, zijn er nog geen afweerstoffen, maar wel blauwtong virus aanwezig in het bloed.

De **gevolgen voor uw bedrijf** van een melding bij de NVWA zijn beperkt, maar wel belangrijk. Er wordt niet geruimd, zieke dieren kunt u gewoon behandelen, uw melk kan geleverd aan de fabriek, slachtkoeien kunnen naar het slachthuis. Maar vee voor het leven verkopen of nuchtere kalveren naar de mester verplaatsen kan dan niet. Dat is omdat het blauwtongvirus op die manier in andere delen van het land kan komen. En dat willen we natuurlijk voorkomen.

Preventie. Voorkom dat uw vee in aanraking komt met knutten! Dat kan bijvoorbeeld door het gebruiken van een pour-on insecticide, zoals Deltanil. Deltanil hebben we ruim op voorraad in onze apotheek. Er zijn diverse andere werkzame pour-on insecticides op de markt en verkrijgbaar. Lees de bijsluiter voor een juist gebruik.

Vaccineren is nog niet mogelijk omdat er nog geen vaccin is en omdat nog niet bekend is of de bestaande vaccins beschermen tegen dit type blauwtongvirus.