



Dierenartsen
Amstel, Vecht en Venen

Nieuwsbrief Rund

Blauwtong (editie 2)

12 SEPTEMBER 2023

Blauwtong

Verschuinselen

Regio

Voorkomen van besmetting en verspreiding

Er is Blauwtong vastgesteld bij schapen en koeien in de regio. Deze tweede nieuwsbrief hierover bevat nieuwe relevante informatie.

De verschuinselen van blauwtong bij schapen en koeien staan beschreven in de eerste editie van deze nieuwsbrief.

Incubatietijd

Tussen de knutten-steek en ziek worden zitten 5 tot 20 dagen. En niet alle besmette dieren zullen zichtbaar ziek worden. Daar moeten we rekening mee houden als we verspreiding van het virus vee via veetransport tegen willen gaan. We willen niet dat vervoer van ons vee en onze nuchtere kalveren de reden is dat het blauwtong-virus heel snel in andere delen van het land komt.



Verspreiding van het virus

We willen verspreiding van het blauwtong-virus naar andere delen van het land vertragen. Als u verschuinselen ziet bij uw vee: bel het meldpunt dierziekten op telefoonnummer **045-5463188**. We willen u op het hart drukken om verdachte gevallen te melden. Officiële melding van blauwtong-verdenkingen is nodig om de verspreiding van het blauwtong-virus te monitoren.

Melden helpt experts, sector-partijen en het ministerie in hun analyses en helpt om over passende proportionele maatregelen te beslissen.

Uw melding

Na melding bestaat de kans dat een NVWA-dierenarts het zieke dier wil zien en een bloedmonster afnemen. Naarmate er meer bedrijven besmet blijken, zal niet elke melding daadwerkelijk bezocht worden door een NVWA dierenarts. Als een NVWA dierenarts uw bedrijf bezoekt, zal hij alleen aandacht geven aan uw zieke dieren en geen andere zaken onder de loep nemen.





Dierenartsen
Amstel, Vecht en Venen

Nieuwsbrief Rund

Blauwtong (editie 2)

12 SEPTEMBER 2023

Blauwtong

Verschuinselen

Regio

Voorkomen van besmetting en verspreiding

De gevolgen voor uw bedrijf van een melding zijn beperkt. Zieke dieren worden niet geruimd, maar kunt u gewoon behandelen. De melk kan geleverd vee kan naar het slachthuis kan. Maar vee voor het leven verkopen of nuchtere kalveren naar de mester verplaatsen kan niet. Dat is omdat het blauwtong-virus ook in zichtbaar gezonde kalveren mee kan liften en op die manier heel snel in andere delen van het land kan komen.

Knuten. Er zijn honderden verschillende soorten knuten. 1 of enkele soorten daarvan kunnen het blauwtong-virus verspreiden. *Culicoides imicola* is een bekende verspreider van het blauwtong-virus. Dat is een heel kleine knuten-soort en deze wordt minder actief wanneer de buitentemperatuur daalt in de herfst

Preventie Voorkom dat uw vee in aanraking komt met knuten! De knuten zijn het meest actief buiten de stal in de avondschemer. Opstallen in een stal met ventilatoren tijdens de schemering helpt. Pour-on insecticides, zoals Deltanil, hebben een beperkt effect. Deltanil hebben we op voorraad in onze apotheek. Er zijn diverse andere werkzame pour-on insecticides op de markt en verkrijgbaar. Lees de bijsluiter voor een juist gebruik met aandacht voor de waarschuwingen over de toxiciteit voor mens, dier en milieu.



Rechts op de foto een kleine steekmug. En links op de foto ziet u het kleine formaat van een culicoides-knut

Vaccineren is niet mogelijk omdat er geen vaccin is tegen dit serotype 3. Ontwikkeling van een vaccin kosten jaren. Vaccineren met een blauwtong-vaccin dat tegen een ander serotype is gericht is vrijwel zeker niet effectief en raden we daarom af.