



Dierenartsen
Amstel, Vecht en Venen

Blauwtong in de
hele regio

Behandeling en
verzorging zieke
dieren

Bijwerkingen
pijnstillers

Euthanasie bij
uitzichtloos lijden

Nieuwsbrief schaap en rund

Blauwtong (editie 4)

28 SEPTEMBER 2023

Blauwtong is in het gehele praktijkgebied aanwezig. Het aantal zieke beesten, de ernst van de ziekte en de sterfte gaat de ergste verwachting te boven. Deze vierde nieuwsbrief bevat tips en opmerkingen over de behandeling en verzorging van de ernstig zieke dieren:

Schapen:

- Antibiotica zoals Engemycine en Procopen helpen om secundaire bacteriële ontstekingen te beperken (longontsteking, keelontsteking, zweren in het maag-darmkanaal). Behandel daarom ernstig zieke dieren langdurig (tot maximaal 1-2 weken).
- Dosering pijnstiller Novem bij schapen:
 - Start met een dosis van 1 ml per 20 kilo
 - 48 uur later een dosis van 1 ml per 40 kilo
 - Deze laatste dosering elke 48 uur herhalen
- Om ernstig zieke liggende dieren aan het drinken en vreten te houden helpt het om zo vaak mogelijk vers water en zacht voer in een laag bakje voor hun snufferd aan te bieden. Brijvoer, vers gras, wilgentakken, natte pulp, bostel, fijn kuilgras zijn het proberen waard. Slobber of appelmoes kan je bij schapen in de bek brengen met een spuitje. Pas op het risico van verslikken. Door het water kan je elektrolyten-mix zoals Enerlyte of Benfital mengen.

Koeien:

- Koeien hebben meestal geen antibiotica nodig. Maar een klein deel van de koeien heeft een ernstige vorm van blauwtong met secundaire bacteriële ontstekingen in de longen en het maag-darmkanaal. Geef deze dieren Engemycine of Procopen.
- Pijnstilling bij koeien is het belangrijkste medicijn:
 - elke 24 uur een dosis Ketoprosol van 1 ml per 40 kilo
 - elke 48 uur een dosis Novem van 1 ml per 40 kilo

Koeien en schapen:

- Pijnstillers zoals Novem en Ketoprosol verlagen de koorts en verminderen de pijn aan klauwen en bek. Hierdoor zijn de beesten actiever en vreten ze meer.
- Een bijwerking van pijnstillers is maagzweren. Omdat het blauwtongvirus zelf ook zweren in het maag-darmkanaal kan veroorzaken is nauwkeurige dosering van pijnstillers belangrijk.
- Wees terughoudend met pillen, bolussen en drenchen. Deze beschadigen de gezwollen en ontstoken keel en slokdarm.
- Zodra dieren niet alleen stoppen met vreten, maar daarna ook stoppen met drinken is het uitzichtloos en raden we euthanasie aan. Als de klauwschoentjes loslaten is het uitzichtloos en raden we euthanasie aan.

Het is een zware tijd voor iedereen. Hou vol, dit gaat voorbij, we zitten hier in de regio nu op het dieptepunt van de uitbraak. Dieren die hier doorheen komen zullen langdurige immuniteit hebben opgebouwd.